

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 14 DAL 27/10/2008 AL 31/10/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni

ZONA 1	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
ZONA 2	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
ZONA 3	Zambrone
ZONA 4	San Calogero - Rombiolo
ZONA 5	Joppolo

Fase fenologica: Accrescimento frutti
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	2,75	4,25	3,50	6,50	10	1_2
ZONA 2	3,80	5,80	4,80	6,40	10	1_2
ZONA 3	5,00	5,50	5,25	5,50	10	1_2
ZONA 4	4,33	6,33	5,33	6,33	10	1_2
ZONA 5	4,5	7,00	5,75	7,00	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, anche se risulta inferiore alla soglia minima di intervento fissata al 10 % per le olive da olio, va mantenuto alto il livello di guardia, in quanto si è riscontrato un numero elevato di punture attive; non sono consigliati, comunque, trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforon, Deltametrina ecc.). Negli uliveti monitorati (in particolare nelle zone 1 e 2) si è riscontrato un aumento di attacco di Lebbra. Si consiglia in tutti i casi di procedere con le operazioni di raccolta tenendo in considerazione, come detto nelle scorse settimane, che per ottenere un prodotto qualitativamente buono bisogna raccogliere le olive direttamente dalla pianta. Le olive appena raccolte vanno poste nelle cassette in plastica fessurate e trasportate nel più breve tempo possibile al frantoio (la molitura dovrà avvenire entro le 48 ore dalla raccolta).

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428