

## REG. CE 867/08

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**  
**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 2 DAL 28/06/2010 AL 02/07/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ZONE	
<b>ZONA 1</b>	<b>Fascia del fiume Mesima</b>
<b>ZONA 2</b>	<b>Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto</b>
<b>ZONA 3</b>	<b>Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico</b>
<b>ZONA 4</b>	<b>Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia</b>
<b>ZONA 5</b>	<b>Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero</b>
<b>ZONA 6</b>	<b>Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo</b>

**Fase fenologica:** Ingrossamento dei frutti  
**Patogeno Monitorato:** Prays Oleae (Tignola)



Teigne de l'olive

Numero di insetti maschi catturati per trappola			
	Minima	Massima	Media
<b>ZONA 1</b>	26,00	35,00	30,50
<b>ZONA 2</b>	30,33	43,67	37,00
<b>ZONA 3</b>	29,33	36,67	33,00
<b>ZONA 4</b>	31,67	33,00	32,34
<b>ZONA 5</b>	21,67	31,67	26,67
<b>ZONA 6</b>	38,33	42,67	40,50

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	Anche in questa settimana, in tutte le zone oggetto di monitoraggio, dall'analisi dei frutti e dai dati forniti dalle trappole installate, si è riscontrata la presenza del lepidottero, in calo rispetto alla settimana precedente. Pertanto, al momento, non si consiglia alcun trattamento negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa (solo per le varietà a drupa grossa, per la sola generazione carpofaga per il massimo di 1 intervento) utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione quali: (Dimetoato, Triclorforn, Rotenone) o <i>Bacillus thuringiensis</i> , per le aziende in regime di agricoltura biologica.

**Note:**  
Campionamento: esaminare 100 infiorescenze, su 5-10 piante a caso. La percentuale di infestazione ottenuta, divisa per 3, consente di ottenere la stima del danno che verrà poi arrecato alle drupe dalla generazione carpofaga.  
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e/o integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585

Vibo Valentia lì 09/08/2010

Il tecnico  
Per. Agr. Pasquale Mercatante