

## REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**

**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 7 DAL 08/09/2008 AL 12/09/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni	
<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
<b>ZONA 3</b>	Zambrone
<b>ZONA 4</b>	San Calogero - Rombiolo
<b>ZONA 5</b>	Joppolo

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti  
**Patogeno Monitorato:** Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	1,75	4,75	3,25	<b>6,75</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	2,60	5,20	3,90	<b>4,80</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	3,50	5,00	4,25	<b>4,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	4,00	5,67	4,83	<b>5,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	5,00	6,50	5,75	<b>4,50</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, rispetto la scorsa settimana è in significativo aumento, sono stati raggiunti picchi che vanno dal 4,00 al 6,75 %, anche se al di sotto della soglia minima di intervento, bisogna mantenere un livello di guardia molto alto negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, dove, non sono comunque ancora consigliati interventi chimici, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).

**Note:**  
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.  
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428