

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 09/10/2006 AL 13/10/2006

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

| Comuni | | Patogeno Monitorato: Mosca delle olive |
|---------------|---|--|
| ZONA 1 | Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro | Fase fenologica: Invaiaitura |
| ZONA 2 | San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia | |
| ZONA 3 | Zambrone | |
| ZONA 4 | Joppolo | |



| | Numero di insetti catturati per trappola | | | Infestazione % | Soglia d'intervento | |
|---------------|--|---------|-------|----------------|---------------------|-------|
| | Minima | Massima | Media | | olio | mensa |
| ZONA 1 | 9,73 | 14,18 | 11,95 | 15,45 | 10 | 1_2 |
| ZONA 2 | 10,33 | 15,33 | 12,83 | 12,17 | 10 | 1_2 |
| ZONA 3 | 9,50 | 14,50 | 12,00 | 13,50 | 10 | 1_2 |
| ZONA 4 | 10,00 | 14,50 | 12,25 | 17,00 | 10 | 1_2 |

| Zona | Interventi consigliati |
|--------------|--|
| Tutte | <p>La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni climatiche molto favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione della mosca delle olive, l'analisi delle drupe campionate dimostra che in tutte le zone oggetto di monitoraggio la soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio e al 2% per quelle da mensa è stata superata, è pertanto consigliabile, in tutti quei casi in cui non si è provveduto ad eseguire nessun trattamento chimico, ad intervenire chimicamente con prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.), si consiglia inoltre, ove possibile di avviare le operazioni di raccolta tenendo presente i giorni di carenza indicati sulla confezione del prodotto usato per i precedenti trattamenti.</p> <p>Negli uliveti esaminati (in modo particolare nelle zone 1, 2 e 3) si è riscontrato, sui frutti, un aumento di attacchi di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno Gloeosporium olivarum in quest'ultimo caso si consigliano trattamenti con prodotti rameici.</p> |

Note:
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 16/10/06

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante