

## REG. UE 611-615/2014

**AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA**  
**MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N.17 -PERIODO DAL 05/10/2015 AL 10/10/2015

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**Fase fenologica:** Invaiaitura

**Patogeno Monitorato:** Mosca dell'olivo

#### COMUNI

**ZONA 1** Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

**ZONA 2** Fascia collinare Maierato

**ZONA 3** Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

**ZONA 4** Fascia collinare Filandari - San Calogero

**ZONA 5** Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	1,17	3,33	2,25	<b>1,83</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	1,00	4,00	2,50	<b>5,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	1,50	3,50	2,50	<b>2,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	2,00	3,50	2,75	<b>1,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	3,00	4,00	3,50	<b>4,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	L'infestazione media riscontrata in tutte le zone oggetto di monitoraggio, questa settimana rispetto la precedente è in leggero aumento, i picchi raggiunti vanno dal 1,50 al 5,00 % al di sotto della soglia minima di intervento, non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.); si consiglia inoltre, ove possibile, di anticipare le operazioni di raccolta tenendo in considerazione che per ottenere un prodotto qualitativamente buono bisogna raccogliere le olive direttamente dalla pianta. Le olive raccolte vanno poste nelle cassette in plastica fessurate e trasportate nel più breve tempo possibile al frantoio (la molitura dovrà avvenire entro le 48 ore dalla raccolta).

#### Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428

Vibo Valentia lì 12/10/2015

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante