

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 03/10/2010 AL 11/10/2010

Il presente bollettino viene pubblicato allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Catanzaro indicazioni e consigli utili per il controllo della Mosca delle olive. Oltre che sul sito dell'OP www.apounasco.it il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/746585

PROVINCIA DI CATANZARO

Fase fenologica: Invaiatura

Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



COMUNI

ZONA 1 Fascia costiera ionica da Squillace a Guardavalle

ZONA 2 Fascia costiera ionica da Squillace a Botricello

ZONA 3 Fascia collinare da Squillace a Guardavalle

ZONA 4 Fascia collinare da Squillace a Belcastro

ZONA 5 Fascia collinare Crotonese

	Numero di insetti maschi catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	10,00	15,00	12,50	13,00	10	1_2
ZONA 2	10,11	14,56	12,33	14,00	10	1_2
ZONA 3	10,00	14,00	12,00	13,00	10	1_2
ZONA 4	9,43	13,29	11,36	13,00	10	1_2
ZONA 5	9,70	12,60	11,15	12,00	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>I controlli settimanali confermano la presenza dell'insetto al di sopra della soglia d'intervento, infatti le analisi delle drupe presentano una infestazione attiva, (uova e larve di diversa generazione), comprese tra 12 e 14%. Le condizioni climatiche sono state altalenanti, alternando a giornate soleggiate condizioni di piovosità sparse e di breve durata. Le olive si trovano nella fase fenologica detta dell'invaiatura cioè del cambiamento di colore dal verde al nero violaceo più accentuato nelle zone marine rispetto a quelle collinari. Si consiglia, pertanto, allo scopo di contenere lo sviluppo di uova e larvette, di intervenire chimicamente con prodotti adeguati allo scopo, di tipo sistemico ad azione citotropica quali (Fosmet, Dimetoato, Deltametrina ecc). Considerando l'importanza di rispettare scrupolosamente il tempo di carenza "cioè i giorni che devono intercorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta" i quali sono variabili in funzione del principio attivo utilizzato riportato sulle confezioni.</p> <p>Per le aziende in regime di agricoltura biologica utilizzare solo prodotti ammessi dal Reg CEE 834/07 e 889/08.</p>

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva.

Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili (*uova + larve di diversa generazione*) al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in alla OP al n. 0961/746585

Catanzaro li 11/10/2010

I tecnici

Dott.Agr. Tedesco Paolo

Per. Agr. Gentile Fortunato