

## REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**

**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 10 DAL 29/09/2008 AL 03/10/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

##### Comuni

<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
<b>ZONA 3</b>	Zambrone
<b>ZONA 4</b>	San Calogero - Rombiolo
<b>ZONA 5</b>	Joppolo

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti  
**Patogeno Monitorato:** Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	4,00	6,25	5,13	<b>9,13</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	4,40	6,60	5,50	<b>8,80</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	5,50	8,50	7,00	<b>7,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	5,00	9,33	7,17	<b>6,33</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	7	9	8,00	<b>6,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	L'andamento climatico di questo periodo è molto favorevole allo sviluppo del fitofago, infatti in tutte le zone monitorate il numero di catture per trappola e l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti è in aumento rispetto la settimana appena trascorsa con numeri che si avvicinano alla soglia minima di intervento anche per le olive da olio. In tutte le zone, ma con molta più attenzione nelle zone 1, 2 e 3 mantenere alto il livello di guardia, non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, in quanto ancora al di sotto della soglia minima di intervento, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).

#### Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia lì 06/10/08

Il tecnico  
Per. Agr. Pasquale Mercatante