

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 08/10/2007 AL 14/10/2007

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni		Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
ZONA 1	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro	Fase fenologica: Invaiaitura
ZONA 2	San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia - Cessaniti	
ZONA 3	Zambrone	
ZONA 4	Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	4,11	5,44	4,78	3,56	10	1_2
ZONA 2	6,29	7,29	6,79	4,14	10	1_2
ZONA 3	5,00	7,00	6,00	3,00	10	1_2
ZONA 4	5,00	7,00	6,00	2,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>Estatì con clima caldo e secco generalmente causano una forte mortalità degli stadi giovanili del fitofago ed il riassorbimento delle uova negli adulti, spesso queste condizioni climatiche provocano un marcato arresto dello sviluppo estivo-autunnale dell'insetto, riducendo notevolmente la densità di popolazione nei mesi successivi.</p> <p>In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, è inferiore alla soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio, viene superata solo quella del 2% relativa alle olive da mensa.</p> <p>E' consigliabile, comunque, in tutti i casi di anticipare le operazioni di raccolta, tenendo in considerazione che per ottenere un prodotto qualitativamente buono bisogna raccogliere le olive direttamente dalla pianta. Le olive raccolte vanno poste nelle cassette in plastica fessurate e trasportate nel più breve tempo possibile al frantoio (la molitura dovrà avvenire entro le 48 ore dalla raccolta).</p> <p>In tutti gli uliveti esaminati si è riscontrato un attacco di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno Gloeosporium olivarum, anche in questo caso si consiglia di anticipare le operazioni di raccolta.</p>

Note:

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 15/10/07

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante