

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 5 DAL 25/08/2008 AL 29/08/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Comuni

| | |
|---------------|---|
| ZONA 1 | Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro |
| ZONA 2 | San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti |
| ZONA 3 | Zambrone |
| ZONA 4 | San Calogero - Rombiolo |
| ZONA 5 | Joppolo |

Fase fenologica: Accrescimento frutti
Patogeno Monitorato: Mosca delle olive



| | Numero di insetti catturati per trappola | | | Infestazione % | Soglia d'intervento | |
|---------------|--|---------|-------|----------------|---------------------|-------|
| | Minima | Massima | Media | | olio | mensa |
| ZONA 1 | 1,13 | 3,00 | 2,06 | 3,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 2 | 1,80 | 3,80 | 2,80 | 2,60 | 10 | 1_2 |
| ZONA 3 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 3,50 | 10 | 1_2 |
| ZONA 4 | 2,33 | 4,67 | 3,50 | 3,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 5 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 10 | 1_2 |

| Zona | Interventi consigliati |
|--------------|--|
| Tutte | <p>L'infestazione media riscontrata nelle zone oggetto di monitoraggio ha raggiunto picchi del 3,50 - 4,00 % al di sotto della soglia minima di intervento, non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).</p> <p>Nel corso della settimana si è registrata una attività temporalesca con piogge sparse con il conseguente abbassamento della temperatura (26 - 28° C.), ciò può essere causa di un aumento della popolazione, mantenere alto il livello di guardia.</p> |

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428