

REG. CE 2080/05

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA

ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 25/09/2006 AL 29/09/2006

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

| Comuni | | Patogeno Monitorato: Mosca delle olive |
|---------------|---|---|
| ZONA 1 | Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro | Fase fenologica: Invaiaitura |
| ZONA 2 | San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia | |
| ZONA 3 | Zambrone | |
| ZONA 4 | Joppolo | |



| | Numero di insetti catturati per trappola | | | Infestazione % | Soglia d'intervento | |
|---------------|--|---------|-------|----------------|---------------------|-------|
| | Minima | Massima | Media | | olio | mensa |
| ZONA 1 | 8,91 | 14,73 | 11,82 | 13,82 | 10 | 1_2 |
| ZONA 2 | 9,00 | 13,50 | 11,25 | 10,83 | 10 | 1_2 |
| ZONA 3 | 10,50 | 15,50 | 13,00 | 10,00 | 10 | 1_2 |
| ZONA 4 | 10,00 | 16,50 | 13,25 | 13,50 | 10 | 1_2 |

| Zona | Interventi consigliati |
|--------------|---|
| Tutte | <p>In tutte le zone oggetto di monitoraggio, anche in questa settimana, è stata superata la soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio e al 2% per quelle da mensa, è pertanto consigliabile, in tutti quei casi in cui non si è provveduto ad eseguire nessun trattamento chimico, ad intervenire chimicamente con prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. I principi attivi utilizzabili possono essere: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc).</p> <p>Negli uliveti esaminati (in modo particolare nelle zone 1, 2 e 3) si è riscontrato, sui frutti, un aumento di attacchi di Lebbra, malattia fungina dovuta al patogeno Gloeosporium olivarum in quest'ultimo caso si consigliano trattamenti con prodotti rameici.</p> |

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 02/10/06

Il tecnico
Per. Agr. Pasquale Mercatante