

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 5 DAL 16/08/2010 AL 21/08/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ZONE		
ZONA 1	Fascia del fiume Mesima	
ZONA 2	Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto	
ZONA 3	Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico	Fase fenologica: Indurimento del nocciolo
ZONA 4	Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia	Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
ZONA 5	Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero	
ZONA 6	Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	3,25	6,13	4,69	5,25	10	1_2
ZONA 2	4,67	6,67	5,67	6,00	10	1_2
ZONA 3	3,50	7,00	5,25	5,50	10	1_2
ZONA 4	4,00	8,50	6,25	6,50	10	1_2
ZONA 5	6,00	8,67	7,33	6,33	10	1_2
ZONA 6	5,00	8,00	6,50	7,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	Anche la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni climatiche non favorevoli allo sviluppo della mosca delle olive, si nota un incremento delle catture della popolazione adulta dell'insetto in particolar modo nella zona n. 6; le temperature elevate hanno rallentato l'attività del parassita. L'analisi delle drupe campionate dimostra che in tutte le zone oggetto di monitoraggio la percentuale di infestazione risulta tra il 5,25 ed il 7,50 e la soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio non è stata raggiunta pertanto non è consigliabile effettuare trattamenti contro il patogeno.

Note:
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585