

## REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**

**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 6 DAL 01/09/2008 AL 05/09/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

##### Comuni

<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
<b>ZONA 3</b>	Zambrone
<b>ZONA 4</b>	San Calogero - Rombiolo
<b>ZONA 5</b>	Joppolo

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti  
**Patogeno Monitorato:** Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	2,00	4,13	3,06	<b>4,25</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	2,20	4,20	3,20	<b>3,80</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	2,50	3,00	2,75	<b>3,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	3,33	5,33	4,33	<b>4,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	3,50	6,50	5,00	<b>5,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	<p>Questa settimana, l'infestazione media riscontrata nelle zone oggetto di monitoraggio, dall'analisi delle drupe campionate, ha raggiunto picchi che vanno dal 3,50 al 5,00 %, al di sotto della soglia minima di intervento; non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, mentre si consiglia di intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).</p> <p>Mantenere alto il livello di guardia in quanto l'andamento stagionale può essere causa di un aumento della popolazione.</p>

#### Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428