

## REG. CE 867/08

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**  
**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 6 DAL 23/08/2010 AL 28/08/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ZONE		
ZONA 1	Fascia del fiume Mesima	<b>Fase fenologica:</b> Accrescimento frutti <b>Patogeno Monitorato:</b> Mosca delle olive
ZONA 2	Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto	
ZONA 3	Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico	
ZONA 4	Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia	
ZONA 5	Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero	
ZONA 6	Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	3,75	6,25	5,00	<b>6,75</b>	10	1_2
ZONA 2	4,33	9,67	7,00	<b>7,00</b>	10	1_2
ZONA 3	7,50	12,00	9,75	<b>8,50</b>	10	1_2
ZONA 4	5,00	8,00	6,50	<b>8,50</b>	10	1_2
ZONA 5	4,33	8,00	6,17	<b>7,67</b>	10	1_2
ZONA 6	9,00	8,00	8,50	<b>8,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>L'infestazione media riscontrata nelle zone oggetto di monitoraggio ha raggiunto picchi fino al 8,50%, al di sotto della soglia minima di intervento, ma in sensibile aumento rispetto alla settimana precedente, al momento non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. Gli insetticidi dovranno essere scelti in base al sistema di coltivazione attuato e più precisamente:</p> <p>in uliveti in <i>conduzione convenzionale</i> Dimethoate, Fosmet, Imidacloprid (Confidor O-TEQ di recente registrazione su olivo), Rotenone;</p> <p>in uliveti a <i>conduzione biologica</i> Estratto di Piretro, Beauveria Bassiana, Spinosad.</p>

**Note:**  
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.  
Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585