

## REG. CE 2080/05

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**

**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

### COMUNICATO FITOSANITARIO N. 8 DAL 15/09/2008 AL 19/09/2008

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

#### PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

##### Comuni

<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Cessaniti
<b>ZONA 3</b>	Zambrone
<b>ZONA 4</b>	San Calogero - Rombiolo
<b>ZONA 5</b>	Joppolo

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti  
**Patogeno Monitorato:** Mosca delle olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	1,63	3,88	2,75	<b>6,25</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	3,20	5,60	4,40	<b>5,60</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	4,50	5,00	4,75	<b>5,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	4,00	6,00	5,00	<b>6,00</b>	10	1_2
<b>ZONA 5</b>	4,50	6,50	5,50	<b>6,50</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	L'infestazione attiva media, negli uliveti monitorati, ha raggiunto picchi che vanno dal 5,00 al 6,50 %, al di sotto della soglia minima di intervento, ma in costante aumento settimana dopo settimana; non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio, in quanto la soglia minima per intervenire per come si evince dalla tabella sopra riportata è del 10 %, è consigliabile invece intervenire negli uliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzando prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca quali: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.).

**Note:**  
Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia lì 22/09/08

Il tecnico  
Per. Agr. Pasquale Mercatante