

**REG. CE 2080/05**

**SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA**

**ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

**COMUNICATO FITOSANITARIO SETTIMANA DAL 01/10/2007 AL 07/10/2007**

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito [www.apounasco.it](http://www.apounasco.it) e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

Comuni		<b>Patogeno Monitorato:</b> Mosca delle olive
<b>ZONA 1</b>	Francica - Mileto - Gerocarne - Soriano Calabro	<b>Fase fenologica:</b> Invaiaitura
<b>ZONA 2</b>	San Costantino Calabro - Ionadi - Vibo Valentia - Cessaniti	
<b>ZONA 3</b>	Zambrone	
<b>ZONA 4</b>	Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
<b>ZONA 1</b>	2,22	3,33	2,78	<b>4,22</b>	10	1_2
<b>ZONA 2</b>	3,43	4,00	3,71	<b>3,86</b>	10	1_2
<b>ZONA 3</b>	4,00	6,00	5,00	<b>3,50</b>	10	1_2
<b>ZONA 4</b>	4,00	6,50	5,25	<b>3,00</b>	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
<b>Tutte</b>	<p>In tutte le zone monitorate, l'infestazione media messa in evidenza dall'analisi dei frutti, è inferiore alla soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio, viene superata invece anche questa settimana la soglia del 2% per le olive da mensa.</p> <p>Di conseguenza, è consigliabile, limitatamente agli oliveti la cui produzione è destinata ad olive da mensa, intervenire chimicamente con prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. I principi attivi utilizzabili possono essere: (Dimetoato, Formotion, Triclorforn, Deltametrina ecc.), oppure anticipare le operazioni di raccolta, infatti si consiglia in tutti i casi di procedere alle operazioni di raccolta, tenendo in considerazione che per ottenere un prodotto qualitativamente buono bisogna raccogliere le olive direttamente dalla pianta. Le olive raccolte vanno poste nelle cassette in plastica fessurate e trasportate nel più breve tempo possibile al frantoio (la molitura dovrà avvenire entro le 48 ore dalla raccolta).</p> <p>In tutti gli uliveti esaminati si è riscontrato un attacco di <b>Lebbra</b>, malattia fungina dovuta al patogeno <b>Gloeosporium olivarum</b>, anche in questo caso si consiglia di anticipare le operazioni di raccolta.</p>

**Note:**

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 08/10/07

Il tecnico  
Per. Agr. Pasquale Mercatante