

REG. CE 867/08

SETTORE C: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA
ATTIVITÀ: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 9 DAL 13/09/2010 AL 18/09/2010

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Frantoi, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ZONE		
ZONA 1	Fascia del fiume Mesima	
ZONA 2	Fascia collinare da Vibo Valentia a Mileto	
ZONA 3	Fascia costiera Tirrenica da Cessaniti a Briatico	Fase fenologica: Accrescimento frutti
ZONA 4	Fascia costiera Tirrenica da Zambrone a Drapia	Patogeno Monitorato: Mosca delle olive
ZONA 5	Fascia collinare da Rombiolo a San Calogero	
ZONA 6	Fascia costiera Tirrenica da Monteporo a Joppolo	



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	6,63	8,75	7,69	9,50	10	1_2
ZONA 2	6,33	9,33	7,83	7,67	10	1_2
ZONA 3	6,00	9,00	7,50	8,50	10	1_2
ZONA 4	5,50	9,50	7,50	10,00	10	1_2
ZONA 5	7,33	10,67	9,00	8,67	10	1_2
ZONA 6	7,50	11,00	9,25	9,50	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>Il numero di catture e l'infestazione attiva riscontrata in tutte le zone oggetto di monitoraggio, in questa settimana, favorite dall'andamento climatico, sono in forte aumento; mantenere alto il livello di guardia. In caso di intervento sia negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio che in quelli la cui produzione è destinata ad olive da mensa utilizzare prodotti dotati di lunga persistenza d'azione ed adeguati a contenere sia lo sviluppo delle larve che degli adulti della mosca. Gli insetticidi dovranno essere scelti in base al sistema di coltivazione attuato e più precisamente:</p> <p>in uliveti in <i>conduzione convenzionale</i> Dimethoate, Fosmet, Imidacloprid (Confidor O-TEQ di recente registrazione su olivo), Rotenone;</p> <p>in uliveti a <i>conduzione biologica</i> Estratto di Piretro, Beauveria Bassiana, Spinosad.</p>

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e/o integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Si ricorda che con l'approssimarsi del periodo autunnale aumenta la probabilità di temporali improvvisi, pertanto, al fine di evitare dilavamento dei terreni, allagamenti e ristagni idrici si consiglia il ripristino e la pulizia delle scoline. Inoltre, evitare di eseguire fresature sui terreni in pendio.

Per eventuale richiesta di assistenza tecnica in campo rivolgersi in Associazione al n. 0963/547428 o 0961/746585