

REG. UE 611-615/2014

AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA
MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 5 PERIODO DAL 13/07/2015 AL 18/07/2015

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Fase fenologica: Accrescimento frutto

Patogeno Monitorato: Mosca dell'olivo

COMUNI

ZONA 1 Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

ZONA 2 Fascia collinare Maierato

ZONA 3 Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

ZONA 4 Fascia collinare Filandari - San Calogero

ZONA 5 Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni

Mouche de l'olive



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	2,33	5,00	3,67	3,83	10	1_2
ZONA 2	1,50	3,50	2,50	4,00	10	1_2
ZONA 3	3,00	6,50	4,75	4,00	10	1_2
ZONA 4	3,00	6,50	4,75	4,50	10	1_2
ZONA 5	2,00	3,00	2,50	3,00	10	1_2

Zona	Interventi consigliati
Tutte	L'attività di monitoraggio eseguita, tenendo in piena considerazione sia il numero degli insetti catturati dalle trappole, sia l'analisi dei frutti prelevati nei vari appezzamenti, non ha evidenziato una significativa attività parassitaria da parte della mosca delle olive (<i>Bactrocera oleae</i>). Il perdurare delle temperature elevate con medie giornaliere di circa 32°C. rallenta l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. Si consiglia di non effettuare alcun trattamento.

Note:

Si consiglia in tutti i casi di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428

Vibo Valentia li 20/07/2015

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante