

**REG. UE 1220/11  
CHE MODIFICA IL REG CE 867/08**

**SETTORE 3: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'OLIO E DELLE OLIVE DA MENSA  
ATTIVITÀ 3A: ASSISTENZA TECNICA IN OLIVICOLTURA**

**COMUNICATO FITOSANITARIO DEL PERIODO DAL 09/06/2013 AL 16/06/2013**

Il presente bollettino viene redatto e pubblicato con lo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori indicazioni e consigli utili per il controllo della Tignola delle olive. Oltre che sul sito dell'Organizzazione di Produttori Olivicoli APOUNASCO ([www.apounasco.it](http://www.apounasco.it)) il bollettino viene affisso presso i comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura; Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/724278

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**Fase fenologica:** Accrescimento frutti

**Patogeno Monitorato:** Prays oleae



Teigne de l'olive

**COMUNI**

- ZONA 1** Fascia costiera ionica da Squillace a Guardavalle  
**ZONA 2** Fascia costiera ionica da Squillace a Botricello  
**ZONA 3** Fascia collinare da Squillace a Guardavalle  
**ZONA 4** Fascia collinare da Squillace a Belcastro  
**ZONA 5** Fascia collinare Crotonese

**Numero di insetti catturati per trappola**

	<b>Minima</b>	<b>Massima</b>	<b>Media</b>
<b>ZONA 1</b>	90,00	135,33	112,67
<b>ZONA 2</b>	75,43	139,71	107,57
<b>ZONA 3</b>	126,00	155,00	140,50
<b>ZONA 4</b>	110,67	163,33	137,00
<b>ZONA 5</b>	105,50	139,50	122,50

<b>Zona</b>	<b>Interventi consigliati</b>
<b>Tutte</b>	Siamo nella fase fenologica dell'accrescimento del frutticino. Nelle aree costiere, le larvette, sviluppatasi dalle uova deposte durante la fase dell'allegagione hanno iniziato la penetrazione, ed attraverso il peduncolo, all'interno dell'olivina andandosi a localizzare nella porzione centrale del seme da dove si accresceranno per tutto il periodo estivo. Il monitoraggio degli adulti viene effettuato attraverso l'utilizzo di trappole attivate con il feromone sessuale che attira il maschio. Nel corso della settimana sono state controllate le trappole posizionate nelle diverse zone, dal controllo si evidenzia un numero di catture maggiore nelle zone collinari rispetto alle fasce costiere. E' consigliabile, nelle aree dove i frutti hanno raggiunto le dimensioni di un grano di pepe, intervenire con prodotti adeguati a contenere la penetrazione e lo sviluppo delle larve. Per quanto concerne i prodotti chimici da utilizzare, si consigliano quelli citotropici o di tipo sistemico (Fosmet, Dimetoato, Deltametina, Formothion ecc) relativamente agli uliveti coltivati secondo i principi dell'agricoltura integrata o convenzionale. In caso di agricoltura biologica : (Bacillus thuringiensis ecc.). Viene altresì consigliato di effettuare i trattamenti in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva dei prodotti chimici.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0961/724278

Catanzaro lì 17/06/2013

Il tecnico  
Dott.Agr. Tedesco Paolo