

**REG. UE 611-615/2014**

**SETTORE 4: MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA  
MISURA 4A: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE, RACCOLTA,  
DI CONSEGNA E DI MAGAZZINAGGIO DELLE OLIVE.**

**COMUNICATO FITOSANITARIO "PERIODO DAL 30/05/2016 AL 03/06/2016"**

Il presente bollettino viene realizzato e divulgato con lo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori informazioni e consigli utili per il controllo della Tignola delle olive (*Prays Oleae*). Oltre che sul sito dell'Organizzazione di Produttori Olivicoli APOUNASCO ([www.apounasco.it](http://www.apounasco.it)) il bollettino fitopatologico viene divulgato nei comuni oggetto del controllo, presso rivendite di prodotti per l'agricoltura;

Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0963/547428

**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**Fase fenologica:** Allegaggione

**Patogeno Monitorato:** *Prays oleae*

**COMUNI**


<b>ZONA 1</b>	<b>Fascia collinare</b>	<b>Francica – Mileto - San Gregorio d'Ippona</b>
<b>ZONA 2</b>	<b>Fascia collinare</b>	<b>Maierato - Vibo Valentia</b>
<b>ZONA 3</b>	<b>Fascia collinare</b>	<b>Briatico - Zungri</b>
<b>ZONA 4</b>	<b>Fascia collinare</b>	<b>San Calogero - Rombiolo - Limbadi</b>
<b>ZONA 5</b>	<b>Fascia collinare</b>	<b>Soriano Calabro - Pizzoni</b>



Teigne de l'olive

**Numero di insetti catturati per trappola**

	<b>Minima</b>	<b>Massima</b>	<b>Media</b>
<b>ZONA 1</b>	122,50	133,00	127,75
<b>ZONA 2</b>	126,50	133,00	129,75
<b>ZONA 3</b>	127,50	134,00	130,75
<b>ZONA 4</b>	111,00	117,50	114,25
<b>ZONA 5</b>	122,40	133,40	127,90



<b>Zona</b>	<b>Interventi consigliati</b>
<b>Tutte</b>	Siamo entrati nella fase fenologica di inizio allegaggione, nelle zone collinari - montane, mentre nelle fasce costiere siamo nella fase di fine allegaggione e inizio accrescimento del frutticino. Il volo degli adulti della tignola originatesi dalla generazione antofaga si è fatto intenso, in questo periodo le larvette, che si sono formate dal deposito delle minuscole uova sul calice delle olivine allegate iniziano la fase di penetrazione all'interno attraverso il peduncolo, andando a depositarsi nel seme dove si accresceranno. In tutte le aree interessate è stato effettuato il monitoraggio degli adulti attraverso l'utilizzo di trappole attivate con feromone sessuale che attira il maschio. Nella settimana appena trascorsa, sono state controllate le trappole distribuite nelle diverse zone verificando che il numero di catture è più alto nelle zone costiere con punte di catture di 100 maschi. E'consigliabile, nelle zone dove i frutticini hanno raggiunto le dimensioni di un grano di pepe, intervenire con prodotti specifici a contenere la penetrazione e lo sviluppo delle larve. Relativamente ai prodotti chimici da utilizzare si consigliano quelli citotropici o di tipo sistemico (Fosmet, Dimetoato, Deltametrina, Formothion, ecc) per quanto riguarda gli uliveti condotti secondo il metodo di coltivazione integrata. In caso di agricoltura biologica: ( <i>Bacillus thuringiensis</i> ecc.) avendo l'accortezza di effettuare i trattamenti nelle ore pomeridiane essendo il prodotto fotolabile.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0961/724278

Vibo Valentia, lì 06/06/2016

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante