

REG. UE 611-615/2014

AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA
MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 10 PERIODO DAL 11/09/2017 AL 16/09/2017

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Fase fenologica: Accrescimento frutto

Patogeno Monitorato: Mosca dell'olivo

COMUNI

ZONA 1 Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

ZONA 2 Fascia collinare Maierato


ZONA 3 Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

ZONA 4 Fascia collinare Filandari - San Calogero

ZONA 5 Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	0,29	1,43	0,86	0,57	10	1_2
ZONA 2	0,00	1,00	0,50	0,50	10	1_2
ZONA 3	0,00	2,00	1,00	1,50	10	1_2
ZONA 4	0,00	2,00	1,00	0,50	10	1_2
ZONA 5	0,00	2,75	1,38	1,00	10	1_2



Zona	Interventi consigliati
Tutte	Anche la settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni climatiche non favorevoli allo sviluppo ed alla diffusione della mosca delle olive, infatti il perdurare delle temperature elevate con medie giornaliere di circa 28-30° C. rallenta l'attività del parassita devitalizzando le uova e gli stadi giovanili dell'insetto. L'analisi delle drupe campionate dimostra che in tutte le zone oggetto di monitoraggio la soglia minima d'intervento fissata al 10% per le olive da olio non è stata raggiunta pertanto non è consigliabile effettuare trattamenti contro il patogeno. Sono sconsigliati trattamenti fitosanitari sia chimici che biologici.

Note:

Si consiglia quando ciò è necessario di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica.

Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428 - mail: agristudiomercatante@gmail.com

Vibo Valentia, lì 18/09/2017

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante