

REG. UE 611-615/2014

AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA
MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 11 PERIODO DAL 18/09/2017 AL 23/09/2017

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Fase fenologica: Accrescimento frutto

Patogeno Monitorato: Mosca dell'olivo

COMUNI

ZONA 1 Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona

ZONA 2 Fascia collinare Maierato


ZONA 3 Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

ZONA 4 Fascia collinare Filandari - San Calogero

ZONA 5 Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni



	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	0,43	2,00	1,21	0,86	10	1_2
ZONA 2	0,50	2,50	1,50	1,00	10	1_2
ZONA 3	0,00	1,50	0,75	1,50	10	1_2
ZONA 4	0,50	3,00	1,75	0,50	10	1_2
ZONA 5	0,75	6,25	3,50	0,75	10	1_2



Zona	Interventi consigliati
Tutte	<p>Dal controllo delle trappole utilizzate per il monitoraggio della mosca dell'olivo non si rilevano punti critici di superamento della soglia minima stabilita di infestazione.</p> <p>Le condizioni climatiche registrate nella settimana appena trascorsa, sono state caratterizzate da temperature di circa 22 – 23 °C con alta umidità relativa. L'infestazione attiva, costituita dalla somma tra uova e larve vive presenti nelle olive è insignificante e lontana dal valore soglia in tabella, min 0,5% e max 1,50%. E' consigliabile controllare il proprio uliveto, per verificare l'eventuale presenza di olive con punture fertili ed al superamento della soglia di intervento intervenire con prodotti adeguati al proprio metodo di conduzione aziendale. Nella tabella sopra esposta è riportata la percentuale d'infestazione attiva per fascia di controllo.</p> <p>I trattamenti preventivi con i fitofarmaci non sono necessari.</p>

Note:

Si consiglia quando ciò è necessario di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428 - mail: agristudiomercatante@gmail.com

Vibo Valentia, li 25/09/2017

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante