

REG. UE 611-615/2014

AMBITO DI INTERVENTO2: MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA
MISURA 2C: PROGETTI DI DIMOSTRAZIONE PRATICA DI TECNICHE ALTERNATIVE ALL'IMPIEGO DI PRODOTTI CHIMICI PER LA LOTTA ALLA MOSCA DELL'OLIVO, NONCHÈ PROGETTI DI OSSERVAZIONE DELL'ANDAMENTO STAGIONALE

COMUNICATO FITOSANITARIO N. 12 PERIODO DAL 25/09/2017 AL 30/09/2017

Il presente bollettino viene emesso allo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori della provincia di Vibo Valentia indicazioni e prescrizioni sui trattamenti da effettuare per il controllo della Mosca delle olive, viene divulgato sul sito www.apounasco.it e presso i comuni oggetto di controllo (Rivendite di prodotti per l'agricoltura, Comunità Montane, Comuni). Per eventuali informazioni telefonare al numero 0963/547428

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Fase fenologica: Accrescimento frutto

Patogeno Monitorato: Mosca dell'olivo

Mouche de l'olive



COMUNI

ZONA 1 Fascia collinare Mileto - Francica - San Gregorio d'Ippona


ZONA 2 Fascia collinare Maierato

ZONA 3 Fascia collinare Cessaniti - Zungri - Briatico

ZONA 4 Fascia collinare Filandari - San Calogero

ZONA 5 Fascia collinare Soriano Calabro - Pizzoni

	Numero di insetti catturati per trappola			Infestazione %	Soglia d'intervento %	
	Minima	Massima	Media		olio	mensa
ZONA 1	0,14	2,14	1,14	0,71	10	1_2
ZONA 2	0,50	2,00	1,25	0,00	10	1_2
ZONA 3	0,50	2,50	1,50	0,50	10	1_2
ZONA 4	0,50	2,50	1,50	0,50	10	1_2
ZONA 5	0,00	2,00	1,00	1,00	10	1_2



Zona	Interventi consigliati
Tutte	Questa settimana, l'infestazione media riscontrata nelle zone oggetto di monitoraggio, dall'analisi delle drupe campionate, ha raggiunto picchi che vanno al di sotto della soglia minima di intervento; non sono consigliati trattamenti negli uliveti la cui produzione è destinata alla produzione di olio. Mantenere alto il livello di guardia in quanto l'andamento stagionale può essere causa di un aumento della popolazione.

Note:

Si consiglia quando ciò è necessario di procedere al monitoraggio delle drupe nel proprio uliveto per verificare il grado di infestazione attiva. Prelevare, a caso da piante sparse, circa 100 drupe e verificare la presenza di punture fertili, al superamento della soglia d'intervento fissata al 10% procedere al trattamento impiegando prodotti ad azione citotropica. Per le aziende in regime di agricoltura biologica e integrata, seguire quanto disposto dai propri disciplinari di produzione.

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0963/547428 - mail: agristudiomercatante@gmail.com

Vibo Valentia, li 02/10/2017

Il tecnico

Per. Agr. Pasquale Mercatante