

**BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 6**      **Periodo di Rilevazione: 13/08/2018 - 18/08/2018**

**ORGANIZZAZIONE: APOUNASCO - Unasco**

**STADIO FENOLOGICO :**      Ingrossamento drupe

**COMPRENSORIO:**

**CZ LITORALE BASSO IONIO**




BADOLATO  
BORGIA  
CATANZARO  
DAVOLI  
GUARDAVALLE  
ISCA SULLO IONIO  
MONTAURO  
MONTEPAONE  
PETRIZZI  
SANTA CATERINA DELLO IONIO  
SOVERATO

**CZ COLLINA BASSO IONIO**

STALETTI  
AMARONI  
CATANZARO  
DAVOLI  
GAGLIATO  
MONTAURO  
PALERMITI  
SETTINGIANO  
SIMERI CRICHI  
SQUILLACE  
STALETTI  
TIRIOLO

**CZ LITORALE ALTO IONIO**

AMATO  
ANDALI  
BELCASTRO  
BOTRICELLO  
CARAFFA DI CATANZARO  
CATANZARO  
CERVA  
CROPANI  
SELLIA MARINA  
SERSALE  
SETTINGIANO  
SIMERI CRICHI  
SOVERIA SIMERI

| Comprensorio            | Catture<br>(Media/Trappola) | % Olive Infestate | Soglia di infestazione | Tendenza rispetto al precedente monitoraggio | Livello di criticità  |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--|---|
| CZ LITORALE BASSO IONIO | 9,17                        | 7,18              | 10                     | =  |  |
| CZ LITORALE ALTO IONIO  | 7,98                        | 7,1               | 10%                    | =  |  |
| CZ COLLINA BASSO IONIO  | 10,38                       | 7,75              | 10%                    | =  |  |

**CONSIGLI PER LA DIFESA**

1) Andamento del parassita:

L'andamento delle catture di *Bactrocera oleae*, per comprensorio, è stazionario ed è influenzato dalle condizioni climatiche. Dal controllo delle olive si rileva una infestazione attiva, somma tra uova e larve nelle drupe, simile per comprensorio ed inferiore alla soglia di intervento. Tuttavia in alcune aree, specialmente dove vi è una buona carica di frutti, dove le condizioni climatiche sono caratterizzate da instabilità con eventi piovosi e soleggiamenti l'attacco della mosca è più rilevante.

2) Andamento climatico e previsioni:

L'andamento climatico della settimana è stato variabile nei diversi comprensori, con piogge localizzate e temperature mediamente alte.

3) Interventi fitosanitari:

Nelle zone dove sono presenti uliveti con una buona carica di frutti, caratterizzate da condizioni climatiche variabili, (eventi piovosi e soleggiamenti) la percentuale di infestazione delle olive è più alta della media comprensoriale. In questi casi, se lo si ritiene necessario, si possono effettuare trattamenti con prodotti chimici adeguati, si consigliano quelli citotropici o di tipo sistemico (Fosmet, Dimetoato, ecc). In caso di uliveti condotti in biologico: (*Bacillus thuringiensis* - Spinosad ecc.) avendo l'accortezza per il *Bacillus thuringiensis* di effettuare i trattamenti nelle ore pomeridiane essendo il prodotto fotolabile. In molti casi si assiste, in prossimità della puntura della mosca, alla presenza di una formazione infossata di colore marrone, suberificata, dovuta alla presenza del fungo *Sphaeropsis dalmatica* che si forma in seguito alla parassitizzazione delle uova di *Bactrocera oleae* da parte del predatore *Prolasioptera berlesiana*, oltre che ad altre formazioni fungine. Si consiglia di monitorare costantemente il proprio uliveto allo scopo di tenere sotto controllo il volo degli adulti.

Utilizzare i prodotti, sia chimici che biologici, con criterio e razionalità seguendo scrupolosamente le indicazioni riportate in etichetta.

