

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N°: 5 **Periodo di Rilevazione: 06/08/2018 - 11/08/2018**

ORGANIZZAZIONE: APOUNASCO - Unasco


STADIO FENOLOGICO : Ingrossamento drupe

COMPRENSORIO:

VV COLLINA VIBONESE

**SORIANO CALABRO
VALLELONGA**

BRIATICO
FILANDARI
FRANCICA
LIMBADI
MILETO
PIZZONI
ROMBIOLO
SAN CALOGERO
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN NICOLA DA CRISSA

Comprensorio	Catture (Media/Trappola)	% Olive Infestate	Soglia di infestazione	Tendenza rispetto al precedente monitoraggio	Livello di criticità
VV COLLINA VIBONESE	1,46	4,5	10	=	

CONSIGLI PER LA DIFESA

1) Andamento del parassita

Il numero di catture rilevate durante il corso della settimana appena trascorsa denota un andamento stazionario rispetto alla settimana precedente, ciò dovuto all'andamento climatico (aumento delle Temperature). Anche il controllo delle olive conferma il dato delle trappole.

Causa temporali estivi verificatesi nella fascia comprendente i comuni di Rombiolo-San Calogero-Mileto, si nota un attacco di olive più marcato rispetto agli altri comuni oggetto di monitoraggio, ma sempre al di sotto della soglia d'intervento fissata al 10% di infestazione attiva.

2) Andamento climatico e previsioni

La fascia collinare interna vibonese è stata interessata da intensi temporali estivi nelle ore più calde della giornata e temperature altalenanti.

3) Interventi fitosanitari

Visto l'andamento climatico favorevole si consiglia di monitorare il proprio oliveto specie in caso di riduzione delle temperature.

Al momento, visto i dati rilevati, non si consigliano trattamenti contro il parassita.

