

**REGG. UE 611-615/2014 S.M.I**  
**II annualità 2021/2022**
**AMBITO DI INTERVENTO 4: MIGLIORAMENTO DELLE QUALITÀ DELLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA**  
**MISURA 4A: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI COLTIVAZIONE, RACCOLTA, DI CONSEGNA E DI MAGAZZINAGGIO DELLE OLIVE.**
**COMUNICATO FITOSANITARIO DEL PERIODO DAL 20/06/2022 AL 26/06/2022**

Il presente bollettino viene realizzato e divulgato con lo scopo di fornire a tutti gli olivicoltori informazioni e consigli utili per il controllo della Tignola delle olive (Prays Oleae). Oltre che sul sito dell'Organizzazione di Produttori Olivicoli APOUNASCO ([www.apounasco.it](http://www.apounasco.it)) il bollettino fitopatologico viene inviato ai comuni oggetto del controllo e presso rivendite di prodotti per l'agricoltura;  
 Per informazioni telefonare, ore ufficio, al numero 0961/724278

**PROVINCIA DI CATANZARO**
**Fasi fenologiche:** Accrescimento Frutto

**Patogeno Monitorato:** Prays oleae

**COMUNI**
**ZONA 1 Fascia costiera ionica da Squillace a Guardavalle**
**ZONA 2 Fascia costiera ionica da Squillace a Botricello**
**ZONA 3 Fascia collinare da Squillace a Guardavalle**
**ZONA 4 Fascia collinare da Squillace a Belcastro**
**ZONA 5 Fascia collinare Crotonese**

**Teigne de l'olive**
**Numero di insetti catturati per trappola**

	Minima	Massima	Media
<b>ZONA 1</b>	<b>58</b>	<b>105</b>	<b>82</b>
<b>ZONA 2</b>	<b>61</b>	<b>99</b>	<b>80</b>
<b>ZONA 3</b>	<b>77</b>	<b>119</b>	<b>98</b>
<b>ZONA 4</b>	<b>69</b>	<b>112</b>	<b>90,5</b>
<b>ZONA 5</b>	<b>29</b>	<b>67</b>	<b>48</b>

<b>Zona</b>	<b>Interventi consigliati</b>
<b>Tutte</b>	In tutte le zone le olive sono nella fase fenologica di pieno accrescimento, Il monitoraggio delle trappole, posizionate nei diversi appezzamenti, mette in evidenza la diminuzione delle catture di Tignola rispetto alla settimana precedente. Nella tabella sono riportate le catture per singola zona con valori che di media sono inferiori alle 90 unità. Per controllare adeguatamente questo insetto, è importante intervenire nel momento opportuno, che si raggiunge quando il frutticino ha le dimensioni di un granello di pepe. Nella fase fenologica dell'allegagione avviene il deposito delle uova sul calicino delle olive appena formate, da queste si svilupperà una larva che penetrerà all'interno, mentre nei frutti in accrescimento il deposito dell'uovo può avvenire alla base del peduncolo. Per controllare la Tignola viene consigliato di utilizzare, per le aziende in regime di agricoltura integrata, i principi attivi (Deltametrina, Acetamiprid ecc) per quelle in regime di agricoltura biologica (Bacillus Thuringiensis, Piretrine naturali ecc.) avendo l'accortezza, per il Bacillus, di effettuare i trattamenti nelle ore pomeridiane essendo il prodotto fotolabile

Per eventuale assistenza tecnica in campo rivolgersi al n. 0961/724278

Catanzaro li 28/06/2022

 L'Ufficio Tecnico  
 Dell'Apounasco